

Vous venez de recevoir un médicament en injection intraveineuse : la Desmopressine injectable (Minirin®) :

Ce produit est utile dans le traitement et la prévention des accidents hémorragiques. L'action du Minirin® est de provoquer la libération des stocks de facteur Willebrand dans le sang circulant, à partir des réserves intracellulaires et parallèlement une augmentation du facteur VIII. Il existe une susceptibilité individuelle importante à ce médicament et un test préalable est nécessaire afin de savoir si cette augmentation des FVIII et Willebrand existe.

Si vous êtes « bons répondeurs », le Minirin® pourra être utilisé comme une alternative au traitement par facteurs de coagulation.

Effets indésirables possibles :

➤ *rush cutané = visage « rouge »*

c'est une vasodilatation physiologique réversible qui apparaît lors de l'injection et disparaît dans l'heure qui suit

➤ *céphalées = « maux de tête »*

soulagées par la prise de paracétamol (l'aspirine est contre-indiquée)

Précautions à prendre :

➤ *restriction hydrique = diminution des apports de liquide*

le Minirin® entraîne une diminution de l'élimination rénale et peut entraîner une « intoxication à l'eau ». En conséquence les apports liquidiens doivent être restreints pendant les 24 heures qui suivent le test.

Par la suite, en cas de traitement d'un épisode hémorragique avec la Desmopressine (Minirin®) et jusqu'à 24 heures après la fin du traitement, vous devez réduire votre consommation de liquides (eau, café, soupe, lait...) afin d'éviter une rétention d'eau.

Patient de moins de 37.5 kg :

Vous pouvez boire 20 ml x (kg) = ml/jour

Patient de plus de 37.5 kg :

Vous pouvez boire = 750 ml/jour

A titre indicatif, voici la contenance approximative, en millilitres, de quelques récipients :

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| - une tasse à déjeuner : 250 ml | - un verre à eau : 200 ml |
| - un grand bol : 350 ml | - un verre à vin : 100 ml |
| - une tasse à café : 100 ml | - un verre à bière : 250 ml |
| - une tasse à thé : 150 ml | - une canette de coca : 330 ml |
| - une assiette creuse : 350 ml | |

➤ *Si vous ressentez les signes suivants :*

- nausées
- hypotonie (sensation de fatigue, une envie anormale de dormir)
- perte de connaissance
- anurie (pas d'urines durant 24 h)
- convulsions
- douleurs abdominales

Ces signes ne doivent pas être négligés et dans ce cas **PREVENIR UN MEDECIN** en lui signalant votre traitement par le Minirin®