eurofins | Biomnis

Fiche de renseignements cliniques
Coprologie fonctionnelle

PATIENT

Nom : ..... Prénom : .....

Age : ..... ans Date de naissance : |__|__| |__|__| |__|__|__|__| Sexe : ☐ F ☐ M

ELASTASE

PROTOCOLE Envoi d'un échantillon de selles, minimum 20 g (ou une noix de selles) à température réfrigérée.

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

Insuffisance pancréatique exocrine connue : ☐ OUI ☐ NON

Si oui, quel diagnostic étiologique : ☐ éthylisme ☐ mucoviscidose ☐ IP idiopathique, médicamenteuse, obstructive

Enzymothérapie substitutive : ☐ OUI ☐ NON

CALPROTECTINE

PROTOCOLE Envoi d'un échantillon de selles, minimum 20 g (ou une noix de selles) à température réfrigérée.

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

MICI (Crohn, RCH) : ☐ OUI ☐ NON

Traitement MICI en cours : ☐ OUI ☐ NON

Si oui, quel traitement : ☐ dérivés salicylés ☐ corticoïdes ☐ immunosuppresseurs ☐ anti-TNF

FECALOGRAMME, STEATORRHEE ET CREATORRHEE SUR 24 HEURES

PROTOCOLE DE RECUEIL ET D'ENVOI DES SELLES :

- Recueil des selles sur 24, 48 ou 72 heures dans des pots de volume suffisant, fournis par le laboratoire.
- Regroupement des selles de 48 ou 72h dans **UN MEME SACHET ET UN SEUL DOSSIER** de façon à constituer un seul examen réalisé à partir d'un pool de selles de 48 ou 72h.
- Ne pas remplir au-delà des 2/3. Volume minimum indispensable = 30g.
- Vérifier le vissage du couvercle pour une bonne fermeture du pot afin d'éviter les fuites de prélèvement.
- Prendre soin de collecter les selles nocturnes.
- Conserver les selles au réfrigérateur pour limiter les phénomènes de fermentation.
- Chaque pot est identifié par le nom, prénom, date de naissance et date de recueil des selles.
- Il est indispensable de fournir les informations sur la durée de recueil des selles au laboratoire.

CONSEILS

- Régime enrichi en beurre (minimum 50g de beurre par jour) les 3 jours précédant le recueil et pendant le recueil pour le dosage de la stéatorrhée et le fécalogramme.
- Eviter le consommation d'oléagineux (cacahuètes, noix, noisettes, avocats) pendant les 3 jours précédant le recueil et pendant le recueil.
- Eviter la prise de médicaments ralentisseurs du transit, les préparations à la coloscopie, les suppositoires, les laxatifs, les pansements intestinaux et les examens radiologiques avec opacification digestive, les 3 jours précédant le recueil et pendant le recueil.

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

Antécédents chirurgicaux digestifs : ☐ Gastrectomie ☐ Colectomie ☐ Autres : .....

Pathologie digestives : ☐ MICI ☐ maladie coeliaque ☐ IPE ☐ Autres : .....

Pathologie endocrinienne, neuro-endocrinienne : ☐ Diabète ☐ Hyperthyroidie ☐ Autres : .....

Notion d'amaigrissement : ☐ OUI ☐ NON *Si oui, préciser :* .....

Nombre de selles par jour en moyenne : .....

Notion de régime alimentaire : ☐ Végétarien ☐ Végétalien ☐ Sans gluten ☐ Aucun ☐ Autres : .....

Traitement en cours (à visée digestive) : .....